

HEPATITE B

Causada pelo vírus da hepatite B, que pode ser transmitido por relações sexuais com parceiros contaminados, transfusão de sangue, uso de seringas e agulhas contaminadas. Produz inflamação no fígado, que pode passar despercebida. Quando sintomática podem aparecer: sintomas de gripe, pele amarela, urina escura e fezes claras. Pode evoluir bem, curando-se espontaneamente, o que ocorre na maioria das vezes. A vacinação previne a infecção.

HEPATITE C

Causada pelo vírus da hepatite C é muito parecida com a hepatite B. O contágio se dá pelas mesmas vias. Pode evoluir para cronificação. Frequentemente não consegue-se detectar nenhum fator de risco nos portadores deste vírus.

Além disso existe a possibilidade de causar a longo prazo doenças no fígado graves, portanto necessitam de seguimento médico.

AIDS/SIDA

Causada pelo vírus HIV, causa a perda progressiva das defesas naturais do organismo contra infecções. A infecção pode não produzir sintomas durante anos, apesar da presença do vírus. O doente pode apresentar febre, diarreia, emagrecimento, gânglios aumentados, pneumonia. Transmite-se da mesma forma que a hepatite. O tratamento das complicações tem melhorado muito a qualidade de vida dos pacientes.

CTA/COAS

Informações e dúvidas ligue para:
(19) 3236.3711/ 3237.6704
saude.coas@campinas.sp.gov.br
Rua Regente Feijó, 637
Centro - Campinas - SP

LOCAIS PARA DOAÇÃO

HEMOCENTRO CAMPINAS

RUA CARLOS CHAGAS, 480 - CIDADE UNIVERSITÁRIA
'ZEFERINO VAZ' - BARÃO GERALDO

0800 722 8432

(19) 3521.8705

DE SEGUNDA A SÁBADO, DAS 7H30 ÀS 15H

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

AV. PREFEITO FARIA LIMA, 200 - PQ. ITÁLIA - CAMPINAS

(19) 3272.5501

(19) 3772.5758

DE SEGUNDA A QUINTA, DAS 7H30 ÀS 15H
SEXTA E SÁBADO, DAS 8H ÀS 17H

HOSPITAL ESTADUAL DE SUMARÉ

AV. DA AMIZADE, 2400 - JD. BELA VISTA - SUMARÉ

(19) 3883.8909

(19) 3883.8900

DE SEGUNDA A SÁBADO, DAS 7H30 ÀS 12H

HEMONÚCLEO DE PIRACICABA

AV. INDEPENDÊNCIA, 953 - BAIRRO ALTO - PIRACICABA

(19) 3422-2019

DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H30 ÀS 13H



Semeie
SOLIDARIEDADE
CULTIVE
A vida



V I D A
0800 722 8432
www.hemocentro.unicamp.br

O que é preciso para ser um DOADOR DE SANGUE?

- Ter entre 18 e 69 anos; serão aceitos candidatos à doação de sangue com idade de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal, para cada doação.
- Maiores de 60 anos não podem realizar a doação pela primeira vez
- Pesar, no mínimo, 50 Kg
- Não estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos e, após o almoço, aguardar 3 horas
- Estar descansado
- Você também não pode fumar até 2 horas antes e 2 horas depois da doação

Para doação é obrigatória a apresentação de documento de identificação com fotografia, emitido por órgão oficial, preferencialmente o RG ou CNH, e a informação do endereço completo, inclusive o CEP



SINTA-SE BEM POR FAZER O BEM

Ao realizar uma doação de sangue, você está ajudando a pelo menos três pacientes que necessitam de transfusão


A doação, respeitando os critérios técnicos, não acarreta qualquer risco para o doador

O sangue coletado pelo Hemocentro Campinas é processado dentro de rigorosos critérios técnicos, separado em componentes e examinado em modernos laboratórios

Esse sangue é distribuído gratuitamente aos hospitais públicos e filantrópicos de nossa região, proporcionando segurança e tranquilidade à população

Por isso tudo, aproveite a oportunidade para fazer parte desse grupo de pessoas solidárias que pensam na doação de sangue como garantia de vida!

Pense naquele que vai receber seu sangue. NÃO PODE DOAR SANGUE A PESSOA QUE:



Estiver com gripe, resfriado ou infecção acompanhado de febre



For portadora de sífilis (cancro), malária (maleita) ou doença de Chagas



For alcoolista crônico, ou tenha ingerido bebida alcóolica nas últimas 12 horas (Prazos inferiores e consumo de pequenas quantidades, devem ser avaliados pelo profissional da triagem)



Tiver sido exposto a situações de risco para doenças sexualmente transmissíveis



História atual ou pregressa de uso de drogas injetáveis ilícitas



Tenha contraído Hepatite após os 11 anos de idade



Tenha realizado endoscopia há menos de 6 meses



Estiver grávida, em período de até 3 meses pós-parto ou se estiver amamentando

INTERVALO PARA DOAÇÕES:



Homens: 60 dias (máximo 4 vezes nos últimos 12 meses)

Mulheres: 90 dias (máximo 3 vezes nos últimos 12 meses)

Idade entre 60 e 69 anos:

180 dias (máximo 2 vezes nos últimos 12 meses)

PROCURE ORIENTAÇÃO SE VOCÊ:



Estiver tomando medicamentos, tiver tomado vacina recentemente e/ou estiver em tratamento médico.

NÃO UTILIZE A DOAÇÃO PARA REALIZAR EXAMES DE SANGUE OU AVALIAR A SUA SAÚDE, ISTO PODE COLOCAR EM RISCO A SUA SAÚDE E A VIDA DOS PACIENTES QUE RECEBERÃO SEU SANGUE.

A Região de Campinas dispõe de um serviço para realização de testes sorológicos de forma gratuita, sigilosa e anônima. Caso seja esse seu interesse na doação de sangue, NÃO DOE! Procure o COAS/CTA, onde seu teste será realizado de forma rápida, segura e confidencial, e caso haja positividade você será orientado apropriadamente.

Leia agora um pouco sobre cada uma das principais doenças que podem ser transmitidas por transfusão de sangue.

DOENÇA DE CHAGAS

A doença é transmitida pelo besouro “barbeiro”, que habita casa de “pau-a-pique”, comuns nas áreas rurais do interior de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e outros estados do Brasil. O portador da doença de Chagas leva uma vida completamente normal na grande maioria das vezes, porém pode vir a ter manifestações de doença cardíaca ou intestinal e portanto necessita de acompanhamento médico.

HTLV I / II

Este vírus, na maioria das pessoas não causa nenhuma doença. Raros pacientes contaminados podem desenvolver uma doença no sistema nervoso ou no sangue.

SÍFILIS

Causada pela bactéria *Treponema pallidum*, que é transmitido principalmente por relações sexuais com parceiros infectados. As vezes produz uma ferida (cancro) que cicatriza sozinha e, semanas depois aparece um vermelhão pelo corpo. Entretanto, também pode não apresentar sintomas. Na maioria das vezes os sintomas desaparecem espontaneamente e podem reaparecer muitos anos depois, com muita gravidade. O tratamento é simples e feito com antibióticos.